



NATURRESERVAT

Välkommen till Möllehässle naturreservat – *grodmark och utmark*



Klockgroda (*Bombina bombina*) blir cirka 50 mm lång, har en svartaktig ovasida och gula eller röda fläckar på buken. Dammar med varierande vattenstånd i ett öppet och välbetat landskap är idealiska lekplatser.

Fire-bellied toad

Möllehässle naturreservat är en rest av den vidsträckt allmanningen Kulla Fälåd. Området har varit utmark, gemensam betesmark, under mycket lång tid och har kvar sin karaktär sedan flera hundra år.

Historiska marker, folk och få

I Möllehässle har det funnits människor sedan stenåldern och det finns spår efter gravar och boplatser. Rester av stengårdsgårdar för tanken till de stora skiftesreformerna under 17- och 1800-talen med nya ägo gränser.

Människor och grodor

Redan i början av 1950-talet fredades en del av dammarna i Möllehässle. Det var för att skydda den då mycket sällsynta klockgrodan som hade sin enda förekomst här. Den var tidigare ganska vanlig i Skåne och det var populärt att flytta med sig några djur till gårdarnas dammar. År 1960 försvann den sista klockgrodan härifrån. Så småningom började man plantera in exemplar från Danmark och det är deras ättlingar som nu klämtar i Möllehässles dammar.

Pjoddar och planter

Möllehässle är en välkänd fågellokal. De många stengårdsgårdarna och tätta buskarna ger skydd och föda till allehanda småfåglar ("pjoddar" på skånska). Vår, vinter och höst rastar eller övervintrar sjöfåglar och vadare. Strandängarna är häckningsplats för småvadare. De välbetade markernas variation mellan salthaltiga, kalkrika, fuktiga och torra partier, ger förutsättningar för en artrik flora.



Kamgräsfjäril (*Coenonympha pamphilus*) är en vanlig fjäril på torra, betade, marker. Larven lever tex på **darrgräs** (*Briza media*).

Small heath butterfly, Quaking grass

St Pers nycklar (*Orchis mascula*) trivs i kalkrika ängs- och hagmarker.

Early purple orchid

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*) är en vaksam fågel som flyger upp och sprider sitt varningsrop vid minsta störning.

Lapwing

Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*) sitter ofta helt öppet på marken eller en sten.

Wheatear

Törnskata (*Lanius collurio*) är en iögonfallande fågel som använder taggarna på tex slån och hagtornsbuskar för att spetsa insekter som matförråd.

Red-backed shrike

Lövskog
Deciduous woodland

Öppen mark
Open land

Odlad mark
Arable land

Våtmark
Wetland

Reservatsgräns
Reserve boundary

Stätta / Grind
Stile / Gate

Cykelstig
Bike Path

Gångväg / stig
Footpath

Skåneleden
Skåneleden trail

Här är du
You are here

Kustarun (*Centaureum littorale*) och **saltåg** (*Sedum acre*) växer båda på fuktiga, sandiga, havsstränder.

Seaside centaury, and salt marsh rush



Möllehässle Nature reserve is the remains of an extensive common called Kulla Fälåd. The area has been grazed for a very long time and has retained the same character for hundreds of years.

History, people and livestock

People have lived at Möllehässle since the Stone Age and there are remains from their graves and settlements. The remnants of the stone walls are a reminder of the new ownership boundaries following the enclosure reforms in the 16th and 17th centuries.

People and amphibians

Some of the ponds at Möllehässle were protected as far back as the 1950s. This was done to conserve the then very rare fire-bellied toad, which only occurred here. The toad was once quite common in

Skåne and it was popular to take a few of the animals back to your farm's ponds. In 1960, the last fire-bellied toad disappeared from here. Gradually individuals were reintroduced from Denmark and it is their offspring that can now be heard in the ponds at Möllehässle.

Birds and plants

Möllehässle is a renowned bird site. The many stone walls and dense bushes provide shelter and food for all sorts of small birds. Waders and sea birds rest or overwinter in the spring, winter and autumn. The coastal meadows are breeding areas for small waders. The fact that the well-grazed areas vary from being slightly salty to chalk-rich, with wet and dry patches means that the area contains a rich flora.



Slån (*Prunus spinosa*) är en mycket tät buske med långa, vassa taggar. Den blommar i maj på bar kvist.

Blackthorn



Hagtorn (*Crataegus sp*) är en tät och taggig buske som erbjuder skydd och mat till många småfåglar.

Hawthorn



Föreskrifter
Inom Möllehässle naturreservat är det förbjudet att:

- campa,
- samla eller skada växter och djur,
- skada eller förändra vattensamlingarna.



Regulations
Within Möllehässle Nature Reserve it is forbidden to:

- camp,
- collect or damage/hurt plants and animals,
- damage or alter areas of water.

Redan år 1951 avsattes fem små dammar på Mölle fälåd som naturminne till skydd för klockgrodan. Möllehässle naturreservat bildades år 1956 och utvidgades 1992. Reservatet omfattar cirka 73 ha. Syftet med reservatet är att bevara det öppna betade strandområdet och att skydda den sällsynta klockgrodan. Området har stor betydelse för landskapsbilden. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. Större delen av området ingår i EU's ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.



www.lansstyrelsen.se/skane



Five small ponds were protected as natural monuments back in 1951 at Mölle fälåd to protect the fire-bellied toad. Möllehässle Nature Reserve was formed in 1956 and extended in 1992. The Reserve covers an area of approximately 73 ha. The aim of the Reserve is to conserve the open, grazed shore area and protect the rare fire-bellied toad. The site has great significance in a landscape perspective. The Nature Reserve is managed by the County Administrative Board of Skåne. The majority of the site is included in the EU's ecological network of protected sites, Natura 2000.

